

Titular de la autorización de comercialización:
Ceva Santé Animale, 10 av. de La Ballastière, 33500 Libourne, Francia.
Fabricante responsable de la liberación del lote:
Ceva Santé Animale, 10 av. de La Ballastière, 33500 Libourne, Francia
AB7 SANTÉ, Chemin des Monges, 31450 Deyme, Francia

Vectra® 3D solución spot-on para perros 1,5-4 kg
Vectra® 3D solución spot-on para perros > 4-10 kg
Vectra® 3D solución spot-on para perros > 10-25 kg
Vectra® 3D solución spot-on para perros > 25-40 kg
Vectra® 3D solución spot-on para perros > 40 kg
Dinotefuran/piriproxifeno/permetrina
Cada ml contiene 54 mg de dinotefuran, 4,84 mg de piriproxifeno y 397 mg de permetrina.
Cada aplicador spot-on suministra:

Peso del perro (kg)	Color del tapón del aplicador	Volumen (ml)	Dinotefuran (mg)	Piriproxifeno (mg)	Permetrina (mg)	N-metil pirrolidona
para perros 1,5-4 kg	Amarillo	0,8	44	3,9	317	Cs 0,8 ml
para perros > 4-10 kg	Verde azulado	1,6	87	7,7	635	Cs 1,6 ml
para perros > 10-25 kg	Azul	3,6	196	17,4	1429	Cs 3,6 ml
para perros > 25-40 kg	Morado	4,7	256	22,7	1865	Cs 4,7 ml
para perros > 40 kg	Rojo	8,0	436	38,7	3175	Cs 8,0 ml

El medicamento veterinario es una solución spot-on amarilla pálida, envasada en aplicadores spot-on de dosis única.

INDICACIONES DE USO: Pulgas: Este medicamento veterinario mata las pulgas de los animales infestados y previene nuevas infestaciones durante un mes. Es eficaz frente a las siguientes pulgas de los perros (*Ctenocephalides felis* y *Ctenocephalides canis*). Este medicamento también evita la multiplicación de las pulgas durante dos meses después de su uso mediante la inhibición de la eclosión de los huevos (actividad ovidica) y mediante la inhibición de la transformación de pulgas inmaduras en pulgas adultas. **Garrapatas:** Este medicamento veterinario mata y repele las garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus* e *Ixodes ricinus* durante un mes, y *Dermacentor reticulatus* hasta tres semanas). Si las garrapatas están presentes cuando se aplica el medicamento veterinario, puede que no todas las garrapatas mueran en las primeras 48 horas, pero sí dentro de la semana. Para la eliminación de las garrapatas, se recomienda utilizar un dispositivo de extracción de garrapatas apropiado. **Flebotomos, mosquitos y moscas del establo:** Este medicamento veterinario repele (previene la picadura) los insectos voladores tales como flebotomos (*Phlebotomus perniciosus*), mosquitos (*Culex pipiens*, *Aedes aegypti*) y moscas del establo (*Stomoxys calcitrans*) durante un mes después de su uso. También mata mosquitos (*Aedes aegypti*) y moscas del establo durante un mes después de su uso.

CONTRAINDICACIONES: No usar en gatos (véase "Advertencias especiales"). Debido a su singular fisiología y a la incapacidad para metabolizar la permetrina (una de las sustancias activas de este medicamento veterinario), este medicamento veterinario no debe usarse en gatos. Si se aplica a un gato, o el gato lo ingiere al lamer un perro recién tratado, este medicamento veterinario puede tener efectos nocivos graves. No usar en caso de hipersensibilidad las sustancias activas o a algún excipiente.

REACCIONES ADVERSAS: Se ha observado enrojecimiento de la piel, picor u otros signos de malestar en la zona de aplicación en raras ocasiones. Estos signos pueden ser leves y transitorios. Si los signos persisten o empeoran, consulte con su veterinario. Se han observado trastornos del comportamiento tales como hiperactividad, vocalización o ansiedad, síntomas sistémicos como letargia o anorexia y síntomas neurológicos como temblor muscular, en raras ocasiones. Se han notificado síntomas de ataxia tales como movimientos inestables en muy raras ocasiones. Se han observado reacciones adversas gastrointestinales (estómago o intestino) como vómito y diarrea en muy raras ocasiones. Se han observado efectos cosméticos transitorios (aspecto húmedo, pelo erizado y apelotonado) en la zona de aplicación en muy raras ocasiones, que normalmente ya no se observan pasadas 48 horas. Además, se han recibido informes aislados sobre convulsiones.

La frecuencia de las reacciones adversas se debe clasificar conforme a los siguientes grupos:
- Muy frecuentemente (más de 1 animal por cada 10 animales tratados presenta reacciones adversas)
- Frecuentemente (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 100 animales tratados)
- Infrecuentemente (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 1.000 animales tratados)
- En raras ocasiones (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 10.000 animales tratados)
- En muy raras ocasiones (menos de 1 animal por cada 10.000 animales tratados, incluyendo casos aislados).

Si observa algún efecto adverso, incluya aquellos no mencionados en este prospecto, o piensa que el medicamento no ha sido eficaz, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

ESPECIES DE DESTINO: Perros.

DOSIS: Unión dorsal puntual. 1 aplicador por perro. Debe tenerse cuidado para aplicar el medicamento únicamente sobre piel intacta (sin heridas) del perro.

Dosis: Determine el tamaño correcto de aplicador spot-on que necesita para su perro (no se recomienda el uso en perros de menos de 7 semanas o que pesen menos de 1,5 kg, véase también la sección "Advertencias especiales"). La dosis mínima recomendada es de 6,4 mg de dinotefuran/kg peso, 0,6 mg de piriproxifeno/kg peso y 46,6 mg de permetrina/kg peso, equivalente a 0,12 ml del medicamento veterinario por kg de peso. La tabla de al lado muestra el tamaño de aplicador spot-on a utilizar en función del peso del perro:

ADMINISTRACIÓN: Cómo aplicar: Retirar el aplicador spot-on del envase.

Paso 1: Sujete el aplicador en posición vertical, colocando los dedos por debajo del disco mayor según se muestra.



Paso 2: Con la otra mano, presione hacia abajo sobre el disco pequeño hasta que los 2 discos se junten. Así se perforará el sello.



Paso 3: El perro debe permanecer de pie en una posición cómoda para facilitar la aplicación. Aparte el pelo hasta que la piel sea visible. Aplique el medicamento (según se indica en el paso 4 más abajo) lentamente con la punta del aplicador sobre la piel.

Paso 4: Usar según la recomendación 4a o 4b:
Recomendación 4a: Apriete suavemente el aplicador y aplique el medicamento en la piel a lo largo de la espalda del perro, empezando entre las escápulas, en el número de puntos y orden que se muestran en el diagrama de más abajo y apretando hasta que el aplicador este vacío. Evitar la aplicación superficial en el pelo del perro. El número de puntos de aplicación dependerá del peso del perro.



Perros desde 1,5 hasta 4 kg peso. 1 pipeta amarilla por perro.
Perros de más de 4 kg hasta 10 kg de peso. 1 pipeta verde azulado por perro para dividir en 2 puntos.
Perros de más de 10 kg hasta 40 kg de peso. 1 pipeta azul o morada por perro para dividir en 3 puntos.
Perros de más de 40 kg de peso. 1 pipeta roja por perro para dividir en 4 puntos.



OU Recomendación 4b: Independientemente del peso del animal, usando la punta del aplicador, separe el pelo de la base de la cola y empiece a aplicar el medicamento, directamente sobre la piel, en una línea continua desde la base de la cola a lo largo del centro de la espalda hasta las escápulas, según se muestra en el dibujo, apretando el aplicador hasta que esté vacío.

Esquema de tratamiento: Tras una única administración el medicamento prevendrá la infestación durante un mes. El tratamiento puede repetirse una vez al mes.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN: Mantener fuera de la vista y al alcance de los niños. Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación. No usar este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que figura en la caja y en el aplicador spot-on después de "CAD/EXP". La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado.

ADVERTENCIAS ESPECIALES: Advertencias especiales para cada especie de destino: Deben tratarse todos los perros del hogar. Los gatos del hogar únicamente deben tratarse con un medicamento veterinario autorizado para su uso en gatos. Las pulgas pueden infestar la cesta del perro, la cama y las zonas de descanso habituales, como alfombras y colchonetas. En caso de infestación masiva por pulgas y al principio de las medidas de control, estas áreas deben ser tratadas con un insecticida adecuado y luego aspiradas regularmente. En caso de sospecha de dermatitis (picor e irritación de la piel), consulte con un veterinario. No usar en gatos. Si el medicamento es ingerido accidentalmente, en gatos puede inducir convulsiones que pueden ser fatales. En caso de exposición accidental, lave el gato con champú o jabón y consulte con un veterinario inmediatamente. Para evitar la exposición accidental de los gatos al medicamento veterinario, mantenga los gatos alejados de los perros tratados hasta que la zona de aplicación esté seca. Es importante asegurarse de que los gatos no laman la zona de aplicación del medicamento en un perro tratado. En caso de una exposición de este tipo consulte con un veterinario inmediatamente. **Precauciones especiales para su uso en animales:** Únicamente para uso externo. No se ha estudiado la seguridad de este medicamento veterinario en cachorros de menos de 7 semanas de edad o en perros que pesen menos de 1,5 kg. Debe evitarse el contacto del medicamento veterinario con los ojos del perro. Si entra en contacto con los ojos, aclarar inmediatamente con agua. No puede excluirse que después del tratamiento se adhiera alguna garrapata aislada. Por esta razón, no puede excluirse completamente la transmisión de enfermedades infecciosas si las condiciones son favorables. El medicamento veterinario sigue siendo eficaz cuando los animales tratados se sumergen en agua (por ejemplo al nadar o durante el baño). La inmersión en agua, repetida semanalmente durante un mes y empezando 48 horas después del tratamiento, así como el lavado con champú 2 semanas después del tratamiento, no afectan a la eficacia de este medicamento. Sin embargo, en el caso de lavado frecuente con champú, o de baño en las 48 horas después del tratamiento, la duración de la actividad puede verse reducida. Para evitar efectos adversos en organismos acuáticos, no permitir que los perros tratados entren en contacto con aguas superficiales durante 48 horas después del tratamiento. Véase también la sección "Precauciones especiales para la eliminación del medicamento". **Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales:** No comer, beber o fumar durante la manipulación del medicamento veterinario. Las personas con hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes deben evitar todo contacto con el medicamento veterinario. Los estudios de laboratorio realizados en conejos y ratas con el excipiente N-metilpirrolidona indican efectos tóxicos para el feto. Las mujeres embarazadas y las mujeres que sospechen que están embarazadas no deben administrar este medicamento veterinario. Las mujeres en edad fértil deben utilizar equipo de protección individual, consistente en guantes, al manipular este medicamento veterinario. Este medicamento veterinario es irritante para los ojos y la piel. Para evitar reacciones adversas: • Lavarse bien las manos inmediatamente después del uso. • Evitar el contacto del medicamento con la piel. • En caso de salpicadura accidental en la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón. • Si el medicamento veterinario entra accidentalmente en contacto con los ojos, lávelos con agua en abundancia. • Los niños no deben entrar en contacto con los perros tratados durante al menos cuatro horas tras la administración del medicamento. Por ello se recomienda tratar a los perros por la tarde, o antes de llevarlos a dar un paseo. • El día del tratamiento, no debe permitirse que los perros duerman junto con sus dueños, especialmente con niños. • Los aplicadores utilizados deben eliminarse inmediatamente y no deben dejarse a la vista o al alcance de los niños. Si la irritación en los ojos o en la piel persiste, o si de modo accidental se ingiere el medicamento, acudir al médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Esperar a que la zona de aplicación esté seca antes de permitir que el perro tratado entre en contacto con las telas o almohadones. **Gestación y lactancia:** No se ha demostrado la seguridad del medicamento veterinario en perros durante la gestación y la lactancia, ni en animales destinados a la cría. Los estudios de laboratorio realizados en conejos y ratas con el excipiente N-metilpirrolidona indican efectos tóxicos para el feto. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación del riesgo/beneficio realizada por el veterinario responsable. Los estudios con cada uno de los ingredientes activos (dinotefuran, permetrina o piriproxifeno), en ratas y conejos, no han evidenciado toxicidad para los animales gestantes o en lactación. Se ha visto que el dinotefuran pasa a la leche en los animales en lactación. **Incompatibilidades:** Ninguna conocida. **Sobredosisificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos):** A parte del enrojecimiento local de la piel o de los cambios cosméticos en la capa de pelo donde se aplicó el medicamento veterinario, no se han observado reacciones adversas en cachorros sanos de 7 semanas, a los que se aplicó el medicamento veterinario 7 veces a intervalos de 2 semanas y con hasta 5 veces la dosis máxima recomendada. Tras la ingestión accidental de la dosis máxima recomendada, pueden producirse vómitos, salivación y diarrea, sin embargo, éstos deberían desaparecer sin tratamiento.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO: Los medicamentos no deben ser eliminados viértiéndolos en aguas residuales o mediante los vertidos domésticos. Este medicamento no se deberá verter en cursos de agua puesto que es peligroso para los peces y otros organismos acuáticos. No contaminar estanques, ríos o acequias con el medicamento veterinario o con los envases usados. Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales. Estas medidas están destinadas a proteger el medio ambiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL: Formatos: Caja de cartón con 1, 3, 4, 6, 12, 24 o 48 aplicadores spot-on de 0,8 ml, 1,6 ml, 3,6 ml, 4,7 ml u 8,0 ml. Es posible que no se comercialicen todos los formatos. **Mecanismo de acción:** Las tres sustancias activas del medicamento veterinario se extienden por la superficie corporal del perro durante el primer día después de la aplicación y permanecen durante 1 mes. Los ingredientes actúan directamente sobre el pelaje de las mascotas sin necesidad de infiltrarse en el flujo sanguíneo. El parásito que entra en contacto con el perro tratado será repelido y/o aniquilado. El dinotefuran mata a los insectos atacando su sistema nervioso. El piriproxifeno actúa sobre las etapas inmaduras de los insectos (huevos, larvas, pupas) mediante la interrupción de su reproducción y su desarrollo. Los huevos de pulgas, larvas y pupas están presentes en el entorno. La permetrina repele y mata los parásitos al atacar su sistema nervioso, lo que conlleva hiperexcitabilidad (efecto de pies calientes para garrapatas), y provocando una acción de derribo (knock-down), de anti-fijación y anti-alimentación (anti-feeding) contra los parásitos. Dinotefuran y permetrina trabajan juntos, en sinergia, para un inicio más rápido de la actividad in vivo. La actividad insecticida contra las pulgas comienza en las 12 horas posteriores a la aplicación. Uso veterinario. Medicamento no sujeto a prescripción veterinaria.

Encontrará información detallada sobre este medicamento veterinario en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos (<http://www.ema.europa.eu/>).

Titular da autorização de introdução no mercado:
Ceva Santé Animale, 10, av. de La Ballastière, 33500 Libourne, França
Fabricante responsável pela libertação dos lotes:
Ceva Santé Animale, 10, av. de La Ballastière, 33500 Libourne, França
AB7 SANTÉ, Chemin des Monges, 31450 Deyme, França

Vectra® 3D solução para unção punctiforme para cães 1,5-4 kg
Vectra® 3D solução para unção punctiforme para cães > 4-10 kg
Vectra® 3D solução para unção punctiforme para cães > 10-25 kg
Vectra® 3D solução para unção punctiforme para cães > 25-40 kg
Vectra® 3D solução para unção punctiforme para cães > 40 kg
Dinotefuran/piriproxifeno/permetrina
Cada ml contém: 54 mg dinotefuran, 4,84 mg piriproxifeno, e 397 mg permetrina.

O medicamento veterinário é uma solução para unção punctiforme, amarelo pálido, acondicionada em aplicadores para unção punctiforme de dose única.

INDICAÇÕES: Pulgas: Este medicamento veterinário mata pulgas em animais infestados e previne novas infestações por um mês. É eficaz contra as seguintes pulgas encontradas em cães (*Ctenocephalides felis* e *Ctenocephalides canis*). Este medicamento veterinário também previne a multiplicação de pulgas durante dois meses após a utilização, incluindo a eclosão dos ovos (atividade ovidica) e incluindo a transformação das pulgas imaturas em pulgas adultas. **Carrasças:** Este medicamento veterinário mata e repele carrasças (carrasças *Rhipicephalus sanguineus* e *Ixodes ricinus* são controladas por um mês, e carrasças *Dermacentor reticulatus* por até três semanas). Se estiverem presentes carrasças quando o medicamento veterinário é aplicado, as carrasças podem não ser todas mortas dentro das primeiras 48 horas após aplicação, mas podem ser mortas dentro de uma semana. Para a remoção das carrasças, recomenda-se a utilização de um dispositivo de remoção de carrasças apropriado. **Flebotomíneos, mosquitos e moscas do estábulo:** Este medicamento veterinário repele (impede a picada) os insetos voadores, tais como flebotomíneos (*Phlebotomus perniciosus*), mosquitos (*Culex pipiens*, *Aedes aegypti*) e moscas do estábulo (*Stomoxys calcitrans*) durante um mês após utilização. Também mata mosquitos (*Aedes aegypti*) e moscas do estábulo (um mês após utilização).

CONTRAINDICAÇÕES: Não administrar em gatos (ver "Advertências especiais"). Devido à sua fisiologia única e incapacidade para metabolizar a permetrina (uma das substâncias ativas deste medicamento veterinário), este medicamento veterinário não deve ser administrado em gatos. Se aplicado a um gato, ou ingerido por um gato que lamba ativamente um cão recentemente tratado, este medicamento veterinário pode ter efeitos prejudiciais graves. Não administrar em casos de hipersensibilidade a alguma das substâncias ativas ou a algum dos excipientes.

REACÇÕES ADVERSAS: Vermelhidão da pele, prurido ou outros sinais de desconforto no local da aplicação foram relatados raramente. Estes sinais podem ser ligeiros e transitórios. Se os sinais persistirem ou piorarem, procurar aconselhamento médico-veterinário. Sinais de alterações comportamentais como hiperatividade, vocalização ou ansiedade, sinais sistémicos como letargia ou anorexia, e sinais neurológicos como tremores musculares, foram relatados em casos muito raros. Sinais de ataxia, como movimentos instáveis, foram relatados em casos muito raros. Reações adversas gastrointestinais (estômago ou intestinos), tais como vómitos ou diarreia, também foram relatados muito raramente. Efeitos cosméticos transitórios (aparência molhada, pelo espetado e emaranhado) no local da aplicação foram relatados muito raramente, no entanto, estes efeitos não são geralmente perceptíveis após 48 horas.

A frequência dos eventos adversos é definida utilizando a seguinte convenção:
- Muito comum (mais de 1 em 10 animais tratados apresentando evento(s) adverso(s))
- Comum (mais de 1 mas menos de 10 animais em 100 animais tratados)
- Pouco frequentes (mais de 1 mas menos de 10 animais em 1.000 animais tratados)
- Raros (mais de 1 mas menos de 10 animais em 10.000 animais tratados)
- Muito rara (menos de 1 animal em 10.000 animais tratados, incluindo relatos isolados)


Caso detete quaisquer efeitos mencionados neste folheto ou outros efeitos, mesmo que não mencionados, ou pense que o medicamento veterinário não foi eficaz, informe o seu médico veterinário.

ESPECIES-ALVO: Cães (cães).



DOSAGEM: Unção punctiforme. 1 aplicador por cão. Determinar o tamanho correto do aplicador para unção punctiforme necessário para o seu cão (a utilização em cães com menos de 7 semanas ou com peso inferior a 1,5 kg não é recomendada, ver também secção "Advertências especiais"). A dose mínima recomendada é de 6,4 mg dinotefuran/kg de peso corporal, 0,6 mg piriproxifeno/kg de peso corporal e de 46,6 mg permetrina/kg de peso corporal, equivalente a 0,12 ml do medicamento veterinário por kg de peso corporal. A tabela à direita mostra o tamanho do aplicador para unção punctiforme a ser utilizado de acordo com o peso do cão.

ADMINISTRAÇÃO: Devem ser tomadas precauções para aplicar o medicamento veterinário somente na pele intacta (não danificada).
Como aplicar: Retirar o aplicador para unção punctiforme da embalagem.

Passo 1: Segurar o aplicador na posição vertical, colocando os dedos por baixo do disco maior, como mostrado.




Passo 2: Com a outra mão, pressionar para baixo sobre o disco menor até que os dois discos se reúnam uniformemente. Isto irá perfurar o selo.




Passo 3: O cão deve estar em pé ou numa posição confortável para uma aplicação mais fácil. Afastar o pelo até a pele estar visível. Aplicar o medicamento veterinário (como indicado a seguir, no passo 4) lentamente com a ponta do aplicador sobre a pele.

Passo 4: Utilizar de acordo com a recomendação 4a ou 4b:
Recomendação 4a: Apertar suavemente o aplicador e aplicar o medicamento veterinário sobre a pele ao longo das costas do cão, começando entre as escápulas, no número de pontos e ordem indicados nos diagramas abaixo e apertando o aplicador até estar vazio. Evitar a aplicação superficial no pelo do cão. O número de pontos de aplicação irá depender do peso corporal do cão.



Cães de 1,5 a 4 kg de peso corporal. 1 pipeta amarela por cão.
Cães com mais de 4 kg e até 10 kg de peso corporal. 1 pipeta verde-azulado por cão para dividir em 2 pontos.
Cães com mais de 10 kg e até 40 kg de peso corporal. 1 pipeta azul ou roxa por cão para dividir em 3 pontos.
Cães com mais de 40 kg de peso corporal. 1 pipeta vermelha por cão para dividir em 4 pontos.



OU Recomendación 4b: Independientemente del peso corporal do cão, utilizando a ponta do aplicador, afastar o pelo da base da cauda e começar a aplicar o medicamento veterinário diretamente na pele, numa linha contínua a partir da base da cauda, ao longo da linha média das costas até as escápulas, como mostrado no diagrama, apertando o aplicador até estar vazio.

Esquema de tratamento: Após uma única administração, o medicamento veterinário irá prevenir a infestação por um mês. O tratamento pode ser repetido uma vez por mês.

PRECAUCÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO: Manter fora da vista e do alcance das crianças. Este medicamento veterinário não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação. Não administrar depois de expirado o prazo de validade indicado na caixa de cartão e no aplicador para unção punctiforme (depois de "EXP"). A validade refere-se ao último dia do mês.

ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS: Advertências especiais para cada espécie-alvo: Todos os cães do lar doméstico devem ser tratados. Os gatos do lar doméstico só devem ser tratados com um medicamento veterinário autorizado para administração em gatos. As pulgas podem infestar o cesto do cão, roupas de cama e áreas de descanso habituais, tais como, tapetes e o mobiliário com têxteis. Em caso de infestação maciça por pulgas e aquando do início da aplicação das medidas de controlo, estas áreas devem ser tratadas com um inseticida apropriado e, em seguida, aspiradas regularmente. Em caso de suspeita de dermatite (prurido e irritação da pele), consultar o médico veterinário. Não administrar em gatos. Se o medicamento veterinário for ingerido acidentalmente, pode induzir convulsões em gatos que podem ser fatais. Em caso de exposição accidental, lavar o gato com champú ou sabão e consultar imediatamente um médico veterinário. De modo a prevenir a exposição accidental dos gatos ao medicamento veterinário, manter os gatos afastados dos cães tratados até que o local de aplicação esteja seco. É importante assegurar que os gatos não lambam o local de aplicação de um cão tratado com este medicamento veterinário. Em caso de exposição deste tipo consultar imediatamente um médico veterinário. **Precações especiais para utilização em animais:** Exclusivamente para uso externo. A segurança deste medicamento veterinário não foi estabelecida em cães com menos de 7 semanas ou com peso inferior a 1,5 kg. Devem ser tomadas precauções para evitar o contato entre o medicamento veterinário e os olhos do cão. Se entrar em contacto com olhos, lavar imediatamente com água. A fixação de carrasças isoladas após o tratamento não pode ser excluída. Por esta razão, a duração da atividade pode ser reduzida. Não deve ser permitida a entrada de cães tratados em cursos de águas superficiais por 48 horas após o tratamento. É importante assegurar que os gatos não lambam o local de aplicação de um cão tratado com este medicamento veterinário. Este medicamento veterinário é irritante para os olhos e a pele. Para evitar reações adversas: • Lavar bem as mãos e imediatamente após a administração. • Evitar o contacto com a pele. • Em caso de derrame accidental na pele, lavar imediatamente com água e lavar o gato. • Se o medicamento veterinário contactar acidentalmente com os olhos, estes devem ser bem lavados com água. • As crianças não devem manipular os cães tratados por pelo menos quatro horas após a administração do medicamento veterinário. Portanto, recomenda-se o tratamento dos cães à noite, ou antes de ir de cama. • No dia do tratamento, os cães tratados não devem ser autorizados a dormir com os seus donos, especialmente crianças. • Os aplicadores utilizados devem ser eliminados de imediato e não deixados à vista e ao alcance das crianças. Se a irritação da pele ou ocular persistirem, ou se o medicamento veterinário for ingerido acidentalmente, dirija-se imediatamente a um médico e mostre-lhe o folheto informativo ou o rótulo. **Gestação e lactação:** A segurança do medicamento veterinário não foi determinada em cães durante a gestação e lactação ou em animais destinados à reprodução. Os estudos de laboratório efetuados em coelhos e ratos com o excipiente N-metilpirrolidona revelaram a ocorrência de efeitos

NOT VECTRA 3D DOG ES PT SK CZ
680x160/FP26.5x160
CODE ARTICLE : 49565-07
Recto Verso
Black

VECTRA 3D DOG 1,5-4KG 3P ES PT SK CZ
ID79089- 79087 - 79085 - 79083 - 79081
CORPS : 8 Pts

MYRIAM 09/03/23